



# 精卵捐贈停看聽懶人包

- 捐贈條件
- 捐贈風險
- 精卵捐贈如何進行
- 捐贈者權益






# 捐贈條件



捐卵者	捐精者
1. 20歲以上，未滿40歲	1. 20歲以上，未滿50歲
2. 未曾捐贈，或曾捐贈而未有活產且未有儲存。	2. 未曾捐贈，或曾捐贈而未有活產且未有儲存。
3. 經依規定實施檢查及評估結果，適合捐贈。	3. 經依規定實施檢查及評估結果，適合捐贈。
4. 以無償方式捐贈	4. 以無償方式捐贈







# 捐贈風險



捐卵者	捐精者
<p>需施打排卵針劑和接受取卵手術，可能引起藥物過敏反應，以及取卵手術與麻醉的風險。</p> <p>(1) 藥物過敏反應：腹脹、噁心、嘔吐、心悸、小便減少，嚴重會有腹水、呼吸困難等。</p> <p>(2) 麻醉風險：心律不整、心臟停止等，麻醉導致死亡的發生率為十萬分之一。</p> <p>(3) 取卵手術風險：出血、感染、泌尿系統受損，及其他偶發之病變。</p>	<p>只需取得約2~5次的精液，且取精前不需使用藥物，故無因藥物引起之風險。</p>



# 精卵捐贈如何進行



人工生殖機構填寫查核申請表

## 主管機關查核

1. 女性年滿20-40歲，男性年滿20-50歲
2. 未曾捐贈，或曾捐贈而未有活產且未有儲存

## 誘導排卵療程

每天施打排卵針，超音波及回診追蹤

醫生判定濾泡成熟

## 取卵手術

1. 利用陰道超音波輔助加上取卵針，抽取卵巢內的濾泡液，再於顯微鏡下找出卵子
2. 施以全身麻醉
3. 可能產生副作用，如腹脹、噁心、嘔吐、心悸、小便減少，嚴重會有腹水、呼吸困難，因手術及麻醉，也有可能產生相關副作用

## 進行檢查及評估包括：

1. 精神疾病
2. 傳染性疾病
3. 遺傳性疾病
4. 其他重要疾病等

## 精液收集

## 血液檢測

收集完成後，先冷凍半年，進行抽血檢查，確定無特定傳染疾病

半年前冷凍精液方可使用





# 捐贈者權益

1. 人工生殖機構不得透露捐贈者及受術夫妻之私密性資料。
2. 不得指定受贈對象，並無償方式捐贈，但受術夫妻得委請醫療機構提供營養費或營養品予捐贈人。
  - (1) 精子捐贈：得支予新臺幣5,000元整。若捐精者到院次數多於3次得酌量增加，但總金額不得超過8,000元整。
  - (2) 卵子捐贈：得支予新臺幣9萬9,000元整。
3. 所捐贈之精卵日後不得請求返還，或聲明保留任何權利。建議捐贈者應該在簽署同意書之前多做思考，以防將來之後悔。
4. 所捐出之精卵所產生之後代，法律地位完全與精卵捐贈者無關，也不享有任何權利，包括財產之繼承。

